



PROCESSIONARIA DEL PINO

Traumatocampa (= Thaumetopoea) pityocampa

Lo sfarfallamento, che può variare da zona a zona, inizia verso la metà di giugno ed il picco dei voli si ha generalmente nel mese di luglio. Le farfalle hanno abitudini crepuscolari e notturne; la loro vita è molto breve, dura circa 1-2 giorni.




Nido invernale di Processionaria



TRAPPOLA CONSIGLIATA MASTRAP L (con alette)

Installare le trappole nella **prima metà di giugno** ed appenderle in posizione medio alta sul lato sud-ovest delle piante.



Il numero delle trappole può variare secondo le caratteristiche della zona ed il grado d'infestazione:

- Nei parchi e nei giardini si consigliano sei-otto trappole per ha, distanti fra loro 40-50m,
- Nei boschi a superficie ampia posizionare le trappole una ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso, disponendole soprattutto nelle zone più soleggiate e dove l'infestazione è di solito maggiore.

L'erogatore va sostituito dopo 4-5 settimane.

Controllare e tenere pulito l'imbuto da foglie e ragnatele.

Sul dorso le larve presentano microscopici peli urticanti che provocano gravi reazioni allergiche nell'uomo e negli altri mammiferi. Queste manifestazioni possono verificarsi anche senza contatto diretto con le larve poiché i peli possono staccarsi ed essere trasportati dal vento.

